

臺灣地區保育鳥類相似種辨識指引

請注意相似鳥種照片中拉線標示的該種外觀色澤、紋路、與大小說明，並利用標準色塊進行比對。

八哥/駕鷓 (臺語)

Acridotheres cristatellus
Crested Myna

- 體長26cm
- 不普遍留鳥
- 保育等級：珍貴稀有野生動物

陳王時攝



八哥與外來種八哥 雀形目/八哥科/八哥屬

5種八哥雌雄外觀相同，均有白色翼斑及白色尾端，分辨時請注意各別體色、嘴色、虹膜顏色、尾下覆羽花紋顏色及眼周有無裸皮的特徵。

因八哥擅模仿聲音，有諸多種類被引入人工飼養作為寵物，經放生活動或逃出野外，與本土種八哥習性相近，產生排擠效應，佔據了本土八哥的生活區域，造成本土種類數量減少，值得警惕。



爪哇八哥/白尾八哥

Acridotheres javanicus
White-vented Myna

- 體長22cm
- 普遍外來入侵種
- 保育等級：一般類野生動物

陳王時攝



泰國八哥

Acridotheres grandis
Great Myna

- 體長26cm
- 稀有外來入侵種
- 保育等級：一般類野生動物

張照煌攝



家八哥

Acridotheres tristis
Common Myna

- 體長26cm
- 普遍外來入侵種
- 保育等級：一般類野生動物

陳王時攝



叢林八哥/林八哥

Acridotheres fuscus
Jungle Myna

- 體長23cm
- 普遍外來入侵種
- 保育等級：一般類野生動物

廖本興攝



標準色塊：
 象牙白 粉紅色 淡藍色 烏黑色
 淡黃色 黃色 橙黃色 灰褐色 黑褐色



麻鷺與黑冠麻鷺 鸛形目/鷺科/麻鷺屬

2種麻鷺屬麻鷺，除黑冠麻鷺成鳥外觀辨識無困難，另亞成鳥與麻鷺體色接近，為分辨請注意各別的頭頂顏色、嘴色、眼先顏色、虹膜顏色、翼覆羽及初級飛羽羽端顏色的特徵。

在臺灣麻鷺屬鳥種有兩種，一為近年來極普遍的黑冠麻鷺，一為稀有過境的麻鷺。麻鷺於過境期與黑冠麻鷺棲息環境交疊，因此常有救傷送醫後才確認為稀有麻鷺之紀錄。麻鷺全球數量不到1,000隻，被列為瀕危鳥種。

● 麻鷺

Gorsachius goisagi Japanese Night Heron

- 體長49cm
 - 稀有過境鳥
 - 保育等級：
其他應予保育之野生動物
- 廖本興攝

● 黑冠麻鷺

Gorsachius melanolophus Malaysian Night Heron

- 體長49cm
 - 普遍留鳥
 - 保育等級：一般類野生動物
- 陳王時攝



亞成鳥

山麻雀與麻雀 雀形目/麻雀科/麻雀屬

2種麻雀屬麻雀外觀均有白色翼帶及黃色腳、黑色虹膜，麻雀成鳥及山麻雀雄鳥特徵明顯易於確認，但麻雀亞成鳥及山麻雀雌鳥有時不易辨別，為分辨請注意各別頭、肩、頰、頸、喉、眼周等斑紋顏色的特徵。

在臺灣麻雀屬鳥種僅兩種，一為極普遍的麻雀，一為稀有留鳥山麻雀。山麻雀棲息於海拔較高的地方，山林開發使其棲地範圍縮小，又因麻雀入侵山區，競爭生活資源，使得該種受到威脅。



麻雀/樹麻雀

Passer montanus Eurasian Tree Sparrow

- 體長13cm
- 普遍留鳥
- 保育等級：
一般類野生動物

成鳥、亞成鳥/陳王時攝



山麻雀


Passer rutilans Russet Sparrow

- 體長14cm
- 稀有留鳥
- 保育等級：瀕臨絕種野生動物

雄鳥/黃文欣、雌鳥/郭耿光攝



亞成鳥



雌鳥

標準色塊：